

Évaluation des valeurs d'élevage avril 2024

1 Répercussions de l'adaptation des bases

Dans la mise en valeur actuelle, l'adaptation annuelle des bases a été effectuée. Par conséquent, les différences entre les bases des races ont également changé (**tableau 1**).

Tableau 1 : Valeurs pour la conversion des valeurs d'élevage de la base Simmental (SI) à Swiss Fleckvieh (SF) et Holstein (HO)

Critère	de SI à SF	de SF à HO	de SI à HO
Lait kg	-751	-1412	-2163
Matière grasse kg	-40	-45	-85
Protéine kg	-22	-36	-58
Matière grasse %	-0.11	+0.16	+0.04
Protéine %	+0.05	+0.14	+0.19
Persistence	+4	+3	+7
Cellules somatiques	+2	+3	+5
Fertilité	+16	+10	+26
Durée d'utilisation	-11	+3	-8
Débit laitier	-1	-3	-4
Déroulement du vêlage direct	-12	-3	-15
Déroulement du vêlage filles	+11	-1	+10
ITP	-11	-17	-28
Format	-5	-9	-14
Bassin			
Membres	+4	-3	+1
Pis	-20	-20	-40
Trayons	-2		

Les répercussions moyennes de l'adaptation des bases au sein des races ressortent du **tableau 2**. L'adaptation des bases ne se répercute pas sur le classement des animaux.

Tableau 2 : Différence des valeurs d'élevage en conséquence de l'adaptation des bases

Critère	SI	SF	HO
Lait kg	-35	-47	-108
Matière grasse kg	-2	-3	-6
Protéine kg	-2	-3	-5
Matière grasse %	0.00	0.00	-0.01
Protéine %	-0.01	-0.01	-0.01
Persistance	0	0	0
Cellules somatiques	-1	0	-2
Fertilité	-2	-1	-1
Durée d'utilisation	0	0	-2
Débit laitier	-1	-2	-1
Déroulement du vêlage direct	-2	-2	0
Déroulement du vêlage filles	-1	0	-1
ITP	0	0	-2
Format	-1	-1	-1
Bassin			0
Membres	-1	-1	-1
Pis	-1	-1	-2
Trayons	+1	+1	